



Draw **O****T****C** in your mind

Over **T**he Counter **d**rugs

The most common cases

A new series to help
pharmacists to understand
their role

Go ahead and download the previous series
Draw **pharmacology** in your mind
from



Pharmacistalaanar.blogspot.com


Ph. Alaa Nasr

Contact me at
Pharm.alaa@gmail.com

 [/dr.alaa.nasr](https://www.facebook.com/dr.alaa.nasr)

لا تنسونا من صالح دعائكم

01 - GIT (Gastro-intestinal tract)



2. Pinworm / Oxyuris

Anus

1. Hemorrhoids

4. العلاج (تابع)

4. المسكنات NSAIDs

في المراحل المتأخرة من البواسير يكون الألم شديد و الألم سببه زى ما قولنا البروستاجلاندينز و دى ممكن نتغلب عليها بالمسكنات لكن زى ما احنا عارفين من الفارماكولوجى ناخذ بالنا من استخدام المسكنات مع مرضى الربو - ضيق التنفس- و ناخذ بالنا لانهم بيزودوا سيولة الدم بالذات الاسبرين (راجع جزء ال Autacoids فى الفارماكولوجى - تقدروا تنزلوه من الموقع فى اسفل الصفحة)

5. مقويات الأوعية الدموية Vasotonics

1- Sodium dobesilate (Doxium®)

مقوى للأوعية الدموية يقلل انتفاخ البواسير لكن مش بيعالج النزيف جرعة مرتين بعد الاكل يوميا

2. Diosmin & Hesperidin (Daflon®)

مقوى للأوعية الدموية + يقلل النزيف علشان كذا ممتاز جدا فى علاج البواسير و الدوالى و بيكتبه كمان دكاترة النساء فى حالات النزيف

فى حالة البواسير الحادة + نزيف: جرعة قرصين 3 مرات يوميا لمدة 4 أيام ثم قرص مرتين فى اليوم لمدة 3 أيام

البواسير المزمنة + نزيف: قرصين 3 مرات لمدة 4 أيام ثم قرص مرتين يوميا لمدة شهرين البواسير الحادة: قرص 3 مرات يوميا لمدة 10 أيام

أمثلة كمان - راجعوا المواد الفعالة- **Dafrex® , Diosed-C® , Dioven® , Veinatic®**
Rutin + Vit.C (Ruta-C® - Rutin-C®)



6. العمليات الجراحية

طبعا الطبيب لما بيلاقى الحالة حرجة بيتم اجراء جراحة مش هناقشها

دى باختصار الحاجات المهمة عن البواسير

ديدان بتكون موجودة فى منطقة الشرج بتعمل

Anal itching

حكة فى منطقة الشرج زى الصورة كدا

و دى حالة متكررة جدا و بنقابلها فى الصيدلية يوميا تقريبا

العلاج

Flubendazole (Fluvermal®, Fluver®)

Albendazole (Alzental®, Bendax®, Vermizole®)

Mebendazole (Antiver®, Verm-1®)

الجرعة

#خذ بالك الديدان بتكون موجودة + البيض بتاعها
علشان كذا الجرعة المفروض تتكرر على 3 أسابيع أو اسبوعين على الأقل كلاتى

الأشربة أغلب زجاجات الدواء هتلاقيها 30 سم أو 60 سم
5 سم صباحا و مساء لمدة 3 أيام و تكرر بعد اسبوع و الاسبوع الذى يليه بمعنى ان لو الجرعات كانت ايام الجمعة و السبت و الاحد يبقى الاسبوع اللى وراه يتكرر العلاج يوم الجمعة و السبت و الاحد و الاسبوع اللى وراه يتكرر الجمعة و السبت و الاحد .. نفس الأيام

بالنسبة **للأقراص** هتلاقى الشريط 6 اقراص
قرص صباحا و مساء لمدة 3 أيام و يكرر زى اللى قولناه فى الاشربة بالظبط



كدا خلصنا بفضل الله كلام فى ال

GIT

فى 6 أجزاء تقدروا تنزلوهم من الموقع اللى فى
اسفل الصفحة

و ماتنسوني من دعائكم
استنوا الأجزاء اللى جاية بإذن الله
بالتوفيق

د. آلاء نصر